



Fluxograma de Atendimento de casos suspeitos 2019-nCoV na Atenção Básica



OSERVAÇÕES

- ✓ Paciente após descartar gravidade, deve encaminhar para casa para isolamento a domicilio por 14 dias, orientar quantos as medidas de cuidados que devem ser adotadas durante ao isolamento;
- ✓ Monitorar contatos domiciliares e orientá-los;
- ✓ Orientar ao paciente sobre a patologia da doença e o que medida ele irá tomar em caso de sinais de alarmes;
- ✓ A equipe da AB deve monitorar o paciente durante o período de isolamento;
- ✓ Os profissionais que irão fazer os primeiros atendimentos e equipe irá transportar o paciente (SAMU) para rede Hospitalar, deverão usar EPI'S de acordo com as normas do MS;
- ✓ Transportar o paciente com máscara cirúrgica;
- ✓ O transporte (SAMU) que irá conduzir o paciente para rede Municipal Hospitalar, deve ser lavado cada término de viagem, com: sabão, agua sanitária e passar álcool gel a 70% em áreas com risco contaminação.

Fluxograma de Atendimento de casos suspeitos 2019-nCoV em Hospitais com Pronto-Atendimento



* - Dar seguimento a fluxo clínico e laboratorial de acordo com diagnóstico síndrômico.

Medidas de Controle: Desde o primeiro contato, fornecer máscara cirúrgica à pessoa com caso suspeito e encaminhá-la para uma área separada ou sala de isolamento.

Medidas de Controle

Desde o primeiro contato, fornecer máscara cirúrgica à pessoas com caso suspeito e encaminhá-las para uma área separada ou sala de isolamento.

Comunicar Imediatamente

Caso suspeito à Secretaria Municipal e Vigilância Epidemiológica para orientações e início das ações de controle e investigação

Prevenção para o profissional

- Isolamento respiratório (máscara N95/PFF2 ou cirúrgica);
- Uso de luvas e avental;
- Lavar as mãos com frequência;
- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência;
- Limitar procedimentos indutores e aerossóis;
- Manter os ambientes limpos e ventilados;
- Uso de óculos de proteção ou protetor facial.

Medidas de Prevenção Populacional

- Isolamento respiratório com máscara cirúrgica, se caso suspeito ou contato;
- Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com lenço e descartar no lixo após o uso;
- Lavar as mãos com água e sabão, ou álcool em gel após tossir ou espirrar;
- Evitar tocar olhos, nariz e boca;
- Manter os ambientes ventilados.